

Tipo Norma	:Resolución 194 EXENTA
Fecha Publicación	:19-01-2012
Fecha Promulgación	:10-01-2012
Organismo	:MINISTERIO DE AGRICULTURA; SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO; DIRECCIÓN NACIONAL
Título	:MODIFICA RESOLUCIÓN N° 3.080, DE 2003, QUE ESTABLECE CRITERIOS DE REGIONALIZACIÓN, EN RELACIÓN A LAS PLAGAS CUARENTENARIAS PARA EL TERRITORIO DE CHILE
Tipo Version	:Unica De : 19-01-2012
Título Ciudadano	:
Inicio Vigencia	:19-01-2012
Id Norma	:1036556
URL	:http://www.leychile.cl/N?i=1036556&f=2012-01-19&p=

MODIFICA RESOLUCIÓN N° 3.080, DE 2003, QUE ESTABLECE CRITERIOS DE REGIONALIZACIÓN, EN RELACIÓN A LAS PLAGAS CUARENTENARIAS PARA EL TERRITORIO DE CHILE

Núm. 194 exenta.- Santiago, 10 de enero de 2012.- Vistos: Lo dispuesto en la Ley N° 18.755 Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero, el decreto ley N° 3.557 de 1980, sobre Protección Agrícola; el decreto ley N° 16 de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga el "Acuerdo de Marrakech" por el que establece la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos anexos que indica; la resolución del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.080 de 2003; y sus modificaciones.

Considerando:

1. Que el Servicio Agrícola y Ganadero es la autoridad oficial encargada de velar por el patrimonio Fito y zoosanitario del país.
2. Que Chile como miembro signatario del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias debe asegurar que sus medidas fitosanitarias se adapten a las características regionales de las zonas de origen y destino de los productos vegetales.
3. Que para este propósito el Servicio Agrícola y Ganadero, mediante los correspondientes Análisis de Riesgo de Plagas, actualiza periódicamente las Listas de Plagas Cuarentenarias para Chile, constituyendo estas plagas parte de la reglamentación fitosanitaria que deberán cumplir los artículos reglamentados para su ingreso al país.

Resuelvo:

Modifícase la resolución N° 3.080 de 2003 del Servicio Agrícola y Ganadero, que "Establece criterios de regionalización, en relación a las plagas cuarentenarias para el territorio de Chile", en lo siguiente:

1. Reemplázase el artículo sexto por el siguiente:
"Artículo sexto: El control oficial de contención de las plagas Thecaphora (Angiosorus) solani, Ralstonia solanacearum (raza 3, biovar 2), Globodera rostochiensis y Globodera pallida genera un área libre de plagas y cuya reglamentación se registrará por las resoluciones específicas en esta materia."
2. Reemplázase el artículo séptimo por el siguiente:
"Artículo séptimo: El control oficial de contención de Brevipalpus phoenicis, Dymicoccus brevipes, Pseudococcus elisae, Diabrotica viridula, Stenochorus mangiferae, Aspidiotus destructor, Aceria hibisci, Eutetranychus banksi y Homalodisca coagulata, todas plagas presentes sólo en la Isla de Pascua, genera a Chile continental como área libre de las mismas; y su reglamentación se registrará por las resoluciones específicas en esta materia."
3. Reemplázase el artículo vigésimo por el siguiente:
Artículo vigésimo: Las plagas señaladas a continuación se encuentran ausentes del territorio nacional, tanto insular como continental:

PLAGA	HOSPEDANTE/PRODUCTO
ACAROS	
<i>Acalitus vaccinii</i>	Vaccinium spp.
<i>Acalitus</i> (=Phytoptus)	Prunus domestica, P. dulcis
<i>phloeocoptes</i>	
<i>Aceria diospyri</i>	Diospyros kaki, Diospyros virginiana
<i>Aceria</i> (=Eriophyes) <i>fraxinivorus</i>	Fraxinus spp.
<i>Aceria</i> (=Eriophyes) <i>litchii</i>	Litchi spp.
<i>Aceria oleae</i>	Olea europaea
<i>Aceria zelkoviana</i>	Zelkova spp.
<i>Aculops tetanothrix</i>	Salix spp.
<i>Amphitetranychus viennensis</i>	Corylus spp., Castanea spp., Rosaceae
<i>Brevipalpus lewisi</i>	Citrus spp., Juniperus spp., Malus spp., Pistacia vera, Punica granatum, Pyrus spp., Vitis spp.
<i>Brevipalpus lilium</i>	Pollifaga-Vaccinium spp.
<i>Brevipalpus russulus</i>	Cactaceae
<i>Bryobia kissophila</i>	Campanula spp.
<i>Bryobia ribis</i>	Ribes spp.
<i>Calacarus citrifolii</i>	Carica papaya, Citrus spp., Rhus pyroides
<i>Cecidophygopsis vermiformis</i>	Corylus spp., Prunus armeniaca
<i>Eotetranychus carpini</i>	Pollifaga de frutales, hortalizas y plantas ornamentales
<i>Eotetranychus populi</i>	Populus spp.
<i>Eotetranychus pruni</i>	Malus domestica, Prunus spp., Vitis vinifera
<i>Eotetranychus weidoni</i>	Populus spp.
<i>Eotetranychus willamettei</i>	Malus spp., Pyrus spp., Vitis vinifera
<i>Eniophyes acericola</i>	Acer spp.
<i>Eniophyes annonae</i>	Annona spp.
<i>Eniophyes armeniaca</i>	Prunus armeniaca, P. cerasifera, P. dulcis, P. persica
<i>Eutetranychus orientalis</i>	Pollifaga de frutales, hortalizas y ornamentales
<i>Oligonychus mileri</i>	Pinus spp., Vitis vinifera
<i>Oligonychus perseae</i>	Persea spp.
<i>Oligonychus ununguis</i>	Coniferales
<i>Oligonychus viridis</i>	Persea americana
<i>Phyllocoptes gracilis</i>	Fragaria spp., Ribes spp., Rubus spp.
<i>Phytoptus emarginatae</i>	Prunus armeniaca, P. domestica
<i>Phytoptus similis</i>	Prunus armeniaca, P. avium, P. domestica
<i>Schaeftetranychus schizopus</i>	Salix spp.
<i>Steneotarsonemus laticaps</i>	Hippeastrum spp., Narcissus spp., Sprekelia formosissima
<i>Tetranychus canadensis</i>	Castanea spp., Malus domestica, Populus spp., Prunus spp.
<i>Tetranychus kanzawai</i>	Pollifaga de frutales, hortalizas y ornamentales
<i>Tetranychus mcdanieli</i>	Malus domestica, Prunus spp., Pyrus communis, Ribes spp., Rubus idaeus, Vitis vinifera
<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	Pollifaga de frutales y ornamentales
<i>Tetranychus pacificus</i>	Asplenium spp., Ficus carica, Juglans regia, Malus domestica, Prunus spp., Pyrus communis, Ribes spp., Vitis spp.
<i>Tetranychus schoenel</i>	Malus spp., Pyrus spp., Prunus spp., Rubus spp.
<i>Tetranychus turkestan</i>	Rosaceae, Vitis vinifera
<i>Vasates</i> (=Phyllocoptes)	Acer spp.
<i>aceriscrumena</i>	
INSECTOS	
COLEOPTERA	
<i>Agrilus</i> spp. (excepto . A. <i>diagrita</i> , A. <i>sulcipennis</i> , A. <i>thoracicus</i>)	Pollifaga de frutales y forestales.
<i>Anoplophora</i> spp.	Acer spp., Citrus spp., Populus spp., Salix spp. y otros
<i>Anthonomus eugenii</i>	Capsicum annuum, C. frutescens, Lycopersicon esculentum
<i>Anthonomus musculus</i>	Vaccinium spp.
<i>Anthonomus pedicularis</i>	Prunus domestica, Pyrus spp.
<i>Anthonomus signatus</i>	Vaccinium spp.
<i>Anthonomus pisi</i>	Malus domestica, Prunus armeniaca, Pyrus communis
<i>Anthonomus pomorum</i>	Cydonia oblonga, Malus domestica, Prunus domestica, Pyrus communis
<i>Anthonomus quadrigibbus</i>	Malus domestica, Prunus spp.
<i>Anthonomus rectirostris</i>	Prunus avium, Prunus cerasus
<i>Anthonomus rubi</i>	Fragaria spp., Ribes spp., Rosa spp.
<i>Apion craccae</i> , A. <i>pisi</i>	Vicia spp.
<i>Brachymerus</i> spp.	Allium cepa, A. porrum, A. sativum
<i>Bruchidius</i> spp. (excepto B. <i>endotubercularis</i>).	Glycine max, Lotus spp., Medicago spp., Trifolium spp.
<i>Bruchus</i> spp. (excepto B. <i>pisorum</i> y B. <i>rufimanus</i>)	Cicer arietinum, Lens culinaris, Phaseolus vulgaris, Vicia spp.
<i>Byturus rubi</i>	Fragaria x ananassa, Rubus spp.
<i>Byturus tomentosus</i>	Ribes spp., Rubus spp. e híbridos (frutos)
<i>Byturus unicolor</i>	Ribes spp., Rubus spp. e híbridos (frutos)
<i>Callosobruchus</i> spp.	Arachis hypogaea, Cicer arietinum, Glycine max, Lathyrus sativus, Lens culinaris, Phaseolus vulgaris, Pisum spp., Sesamum indicum, Vicia spp., Vigna spp.
<i>Capnodis tenebrionis</i> .	Eriobotrya japonica, Malus spp., Prunus spp., Pyrus spp.
<i>Caryedon serratus</i>	Fabaceae
<i>Chrysobothris</i> spp. (excepto <i>Chrysobothris bohrderes</i>)	Pollifaga de forestales, Acer spp., Citrus spp.
<i>Conotrachelus aguacatae</i>	Persea americana
<i>Conotrachelus carinifer</i>	Castanea spp.
<i>Conotrachelus nenuphar</i>	Malus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Vaccinium spp.
<i>Conotrachelus perseae</i>	Persea americana
<i>Conotrachelus retentus</i>	Carya spp., Juglans spp.
<i>Copturus aguacatae</i>	Persea americana
<i>Corechus elatus</i>	Fragaria spp.
<i>Crioceris asparagi</i>	Asparagus officinalis
<i>Cryptorhynchus lapathi</i>	Populus spp., Salix spp.
<i>Curculio caryae</i>	Carya spp.
<i>Curculio carvatrype</i>	Castanea spp.
<i>Curculio elephas</i>	Castanea spp., Quercus spp.
<i>Curculio nucum</i>	Corylus spp.
<i>Curculio sayi</i>	Castanea spp.
<i>Cylindrocaptus</i> spp.	Opuntia spp.
<i>Dendroctonus</i> spp.	Coniferales
<i>Diatraea</i> spp. (excepto D. <i>viridula</i>)	Lycopersicon esculentum, Phaseolus vulgaris, Solanum tuberosum, Zea mays.
<i>Diaprepes abbreviatus</i>	Pollifaga; Citrus spp., Manihot esculenta, Nephelium lappaceum, Saccharum officinarum, Zea mays y otras especies de forestales, frutales y ornamentales
<i>Epicaerus cognatus</i>	Solanum tuberosum
<i>Epilachna</i> spp.	Cucurbitaceae, Phaseolus vulgaris
<i>Epitrix</i> spp. (excepto E. <i>fasciata</i>)	Solanum tuberosum y otras Solanaceae
<i>Eusebea postfasciatus</i>	Manihot esculenta
<i>Gonipterus gibberus</i>	Eucalyptus spp.
<i>Heliphus lauri</i>	Persea americana
<i>Heterobothrys aequalis</i>	Latifoliadas (madera y embalajes)
<i>Hylobius</i> spp.	Coniferales (plantas, madera y embalajes)
<i>Hylotrupes bajulus</i>	Coniferales (madera y embalajes)
<i>Hydurgus palliatus</i>	Pinus spp., Picea spp. (madera y embalajes)
<i>Ips</i> spp.	Coniferales
<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	Solanum tuberosum
<i>Listronotus dauci</i>	Daucus carota
<i>Listronotus oregonensis</i>	Anethum graveolens, Apium graveolens, Daucus carota, Pastinaca sativa, Petroselinum crispum
<i>Listronotus texanus</i>	Anethum graveolens, Daucus carota, Petroselinum crispum
<i>Melanophila californica</i>	Pinus spp. (madera y embalajes)
<i>Metamasius spinolae</i>	Opuntia spp.
<i>Moneliema</i> spp.	Opuntia spp.
<i>Monochamus</i> spp.	Coniferales (madera y embalajes)
<i>Oberia bimaculata</i>	Rubus spp.
<i>Oberia linearis</i>	Pollifaga de frutales y forestales (Castanea spp.)
<i>Oberia myops</i>	Rhododendron spp.
<i>Oemona hirta</i>	Citrus spp., Populus spp., Vaccinium spp.
<i>Oncideres</i> spp.	Carya spp., Diospyros kaki, Juglans regia, Malus domestica, Populus spp.
<i>Oryctes rhinoceros</i>	Cocos spp.
<i>Otiorthynchus cribricollis</i>	Pollifaga de frutales y Fragaria x ananassa
<i>Otiorthynchus ovatus</i>	Pollifaga; Fragaria x ananassa
<i>Pachymerus</i> spp.	Acacia spp., Arachis hypogaea, Arecaceae, Tamarindus indica
<i>Phlyctinus callosus</i>	Malus spp., Prunus domestica, P. persica, P. salicina, Pyrus spp., Vitis vinifera
<i>Phydenus muriceus</i>	Capsicum spp., Lycopersicon esculentum, Solanum spp.
<i>Pissodes</i> spp.	Coniferales

www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Grapevine yellows dorée phytoplasma (' <i>Candidatus</i> <i>Phytoplasma vitis</i> ')	<i>Vitis vinifera</i>
Palm lethal yellowing phytoplasma	<i>Arenga</i> spp., <i>Caryota</i> spp., <i>Chamaedorea</i> spp., <i>Chrysalidocarpus</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Hedera</i> spp., <i>Hyaphorbe</i> spp., <i>Phoenix</i> spp., <i>Pritchardia</i> spp., <i>Trachycarpus</i> spp.
Peach X - disease phytoplasma	<i>Prunus</i> spp.
Peach yellows phytoplasma	<i>Prunus</i> spp.
Pear decline phytoplasma (' <i>Candidatus</i> <i>Phytoplasma pyri</i> ')	<i>Cydonia oblonga</i> , <i>Pyrus</i> spp.
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i>	<i>Chionanthus</i> spp., <i>Fraxinus</i> spp., <i>Jasminum</i> spp., <i>Olea</i> <i>europaea</i>
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>avellanae</i>	<i>Corylus avellana</i>
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>	<i>Cucumis melo</i> , <i>C. sativus</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>C. pepo</i> var. <i>medullosa</i>
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i>	<i>Prunus avium</i> , <i>P. cerasus</i> , <i>P. domestica</i>
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i>	<i>Prunus cerasifera</i> , <i>P. persica</i> , <i>P. persica</i> var. <i>nucipersica</i> , <i>P. salicina</i>
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i>	<i>Lablab purpureus</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Vicia</i> spp.
<i>Ralstonia solanacearum</i> raza 1	Polifaga (Solanaceae, Fabaceae y otros)
<i>Spiroplasma citri</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Fortunella</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i> .
Tomato big bud phytoplasma (Australia)	<i>Vitis</i> spp. y otros
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>fragariae</i> (= <i>Xanthomonas</i> <i>fragariae</i>)	<i>Fragaria</i> spp.
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv <i>pruni</i>	<i>Prunus</i> spp.
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i>	<i>Citrus</i> spp., <i>Fortunella</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i> .
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> (= <i>X. campestris</i> pv. <i>dieffenbachiae</i>)	<i>Anthurium</i> spp., <i>Dieffenbachia</i> spp., <i>Dracaena</i> spp., <i>Philodendron</i> spp.
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i>	<i>Cucurbita pepo</i> , <i>C. pepo</i> var. <i>medullosa</i> , <i>C. ficifolia</i> , <i>C.</i> <i>foetidissima</i> , <i>C. maxima</i> , <i>C. moschata</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>C. metuliferus</i> , <i>C. sativus</i>
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>fici</i>	<i>Ficus</i> spp.
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>hyacinthi</i>	<i>Hyacinthus</i> spp., <i>Scilla</i> spp.
<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i> (<i>X. campestris</i> pv. <i>carotae</i>)	<i>Coriandrum sativum</i> , <i>Daucus carota</i>
<i>Xanthomonas populi</i> (<i>Aplanobacter populi</i>)	<i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp.
<i>Xylella fastidiosa</i> Almond leaf scorch <i>Citrus</i> variegated chlorosis Peach phony disease Pierce's disease Plum leaf scald <i>Xylophilus ampelinus</i>	<i>Prunus dulcis</i> <i>Citrus</i> spp. <i>Prunus</i> spp. <i>Vitis</i> spp. <i>Prunus</i> spp. <i>Vitis</i> spp.

VIROS Y VIROIDES

Apple stem grooving virus	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus communis</i>
Avocado sun blotch viroid	<i>Persea americana</i>
Barley stripe mosaic virus	<i>Avena</i> spp., <i>Bromus mollis</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Festuca</i> spp., <i>Festulolium</i> spp., <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Lolium</i> spp., <i>Panicum maximum</i> , <i>P. millaceum</i> , <i>Secale cereale</i> x <i>T.</i> <i>aestivum</i> , <i>Setaria italica</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>T. durum</i>
Blueberry leaf mottle virus	<i>Vaccinium angustifolium</i> , <i>V. corymbosum</i>
Carnation ringspot virus	<i>Dianthus</i> spp.
Cherry leaf roll virus	<i>Prunus avium</i> , <i>P. cerasifera</i> , <i>P. cerasus</i> , <i>P. serotina</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
Cherry necrotic rusty mottle virus	<i>Prunus avium</i>
Citrus Tristeza virus (CTV) aislados no chilenos	<i>Citrus</i> spp.
Coconut cadang-cadang viroid	<i>Caryota</i> spp., <i>Chamaedorea</i> spp., <i>Chrysalidocarpus</i> spp., <i>Cocos</i> spp., <i>Hyaphorbe</i> spp., <i>Roystonea</i> spp.
Peach mosaic virus	<i>Prunus besseyi</i> , <i>Prunus persica</i>
Peach rosette mosaic virus	<i>Prunus persica</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Vitis</i> spp.
Plum pox virus (excepto raza D)	<i>Prunus</i> spp.
Potato mop-top virus	<i>Solanum tuberosum</i>
Potato spindle tuber viroid (Tomato bunchy top viroid)	<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
Raspberry leaf curl virus	<i>Rubus</i> spp.
Raspberry ring spot virus	<i>Fragaria</i> x <i>ananassa</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus</i> <i>idaeus</i> , <i>R. procerus</i>
Tobacco necrosis virus	<i>Tulipa</i> spp.
Tomato black ring virus	<i>Fragaria</i> spp., <i>Ribes grossularia</i> , <i>R. nigrum</i> , <i>R. uva-crispa</i>
Tomato bushy stunt virus	<i>Prunus avium</i>

MALEZAS

<i>Acroptilon repens</i>
<i>Aegilops cylindrica</i>
<i>Alhagi maurorum</i>
<i>Bracharia purpurascens</i> (= <i>B. mutica</i>)
<i>Brassica kaber</i>
<i>Chondrilla juncea</i>
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>
<i>Euphorbia esula</i>
<i>Helianthus ciliaris</i>
<i>Hydrilla verticillata</i>
<i>Lycium ferocissimum</i>
<i>Pueraria triloba</i> (= <i>P. montana</i> var. <i>lobata</i>)
<i>Rottboellia cochinchinensis</i> (= <i>R. exaltata</i>)
<i>Senecio jacobaea</i>
<i>Solanum carolinense</i>
<i>Solanum viarum</i>

PLANTAS PARASITAS

<i>Arceuthobium</i> spp.
<i>Cuscuta</i> spp. (excepto: <i>C. andina</i> , <i>C. epithymum</i> , <i>C. micrantha</i> , <i>C. microstyla</i> , <i>C. odorata</i> , <i>C.</i> <i>pauciflora</i> , <i>C. pentagona</i> , <i>C. suaveloens</i> , <i>C. werdermanni</i>)
<i>Orobanchae</i> spp. (excepto <i>O. minor</i> y <i>O. ramosa</i>)
<i>Striga</i> spp.

4. Reemplázase el artículo vigésimo primero por el siguiente:

Artículo vigésimo primero: La lista que a continuación se señala considera plagas presentes en parte del territorio nacional y sometidas a control oficial de contención, supresión o erradicación:

.

PLAGA	HOSPEDANTE/ PRODUCTO	DISTRIBUCIÓN
-------	-------------------------	--------------

ACAROS

<i>Aceria hibisci</i>	<i>Hibiscus</i> spp.	Isla de Pascua, V Región
<i>Brevipalpus phoenicis</i>	<i>Citrus</i> spp.	Isla de Pascua, V Región
<i>Eutetranychus banksi</i>	<i>Ficus</i> spp., <i>Prunus</i> spp.	Isla de Pascua, V Región

INSECTOS

COLEOPTERA

<i>Diabrotica viridula</i>	<i>Zea mays</i>	Isla de Pascua, V Región
<i>Sternonchetus mangiferae</i>	<i>Mangifera indica</i>	Isla de Pascua, V Región

HEMIPTERA

<i>Aleurodicus</i> sp. (cercano a <i>A. cocois</i>)	Polífaga: ornamentales y frutales	Provincia Arica, XV Región.
<i>Aspidiotus destructor</i>	<i>Annona cherimolia</i> , <i>Musa paradisiaca</i> , <i>Phoenix</i> spp.	Isla de Pascua, V Región
<i>Dactylopius coccus</i> (*)	<i>Opuntia ficus-indica</i>	Norte del Río Choapa, IV Región
<i>Dysmicoccus brevipes</i>	<i>Ananas comosus</i>	Isla de Pascua, V Región
<i>Homalodisca coagulata</i>	Polífaga (<i>Citrus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Vitis vinifera</i> y otros)	Isla de Pascua, V Región
<i>Pseudococcus elisae</i>	<i>Psidium guajava</i>	Isla de Pascua, V Región
<i>Thaumastocoris peregrinus</i>	<i>Eucalyptus</i> spp.	Comunas Til Til, Colina, Lampa, Quilicura y Pudahuel de la Región Metropolitana y comuna de Rinconada de Los Andes de la Región de Valparaíso.

(*): Bajo producción regulada de carmín.

HYMENOPTERA

<i>Sirex noctilio</i>	<i>Abies</i> , <i>Larix</i> , <i>Picea</i> , <i>Pinus</i> .	Áreas bajo control oficial en las Regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
-----------------------	---	---

LEPIDOPTERA

<i>Phyllocnistis citrella</i>	<i>Citrus</i> spp.	Provincia Arica, XV Región.
<i>Lobesia botrana</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Áreas reglamentadas en erradicación, de las Regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O' Higgins, Maule, Bío Bío, La Araucanía y Metropolitana.

HONGOS

<i>Fusarium circinatum</i>	<i>Pinus</i> spp, <i>Pseudotsuga</i> spp.	Algunos viveros y campos de setos de las Regiones de O' Higgins, Maule, Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos.
<i>Thecaphora</i> (=Angiosorus) <i>solani</i>	<i>Solanum tuberosum</i>	Provincias Parinacota, XV Región; Elqui, IV Región; Comunas Las Cabras, VI Región; Cañete, Coelemu, Cobquecura y Lebu, VIII Región; Carahue y Puerto Saavedra, IX Región
<i>Globodera pallida</i>	<i>Solanum tuberosum</i>	Provincia Petorca, V Región; Comunas Punta Arenas, Porvenir y Timaukel, XII Región
<i>Globodera rostochiensis</i>	<i>Solanum tuberosum</i>	Provincias Parinacota, XV Región; El Loa, II Región; Elqui y Choapa, IV Región; Petorca y Quillota, V Región; Comuna Las Cabras, VI Región; San Javier, VII Región

PROCARIOTAS

<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>	<i>Actinidia</i> spp.	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y Región del Maule
<i>Ralstonia solanacearum</i> raza 3 Biovar 2	<i>Capsicum annuum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum tuberosum</i>	Regiones IV, V, VI, VII y Metropolitana; Comunas San Ignacio y Ñiquén, Prov. Ñuble, VIII Región

VIRUS Y VIROIDES

<i>Plum pox virus</i> raza D	<i>Prunus</i> spp.	Regiones IV, V, VI y Metropolitana
------------------------------	--------------------	------------------------------------

Anótese, comuníquese y publíquese.- Aníbal Ariztía Reyes, Director Nacional
Servicio Agrícola y Ganadero.