



ALERTA FITOSANITARIA ESCARABAJOS DE LA CORTEZA DEL PINO



<i>Hylurgus ligniperda</i>	<i>Hylastes ater</i>	<i>Orthotomicus laricis</i>
Largo 5,0 a 6,0 mm.	Largo 4,0 a 5,0 mm.	Largo 2,7 a 3,8 mm.
Color castaño a negro	Color negro, excepto antenas y partes de patas que son castañas	Color café oscuro a negro
La parte posterior de los élitros es convexa sin espinas	La parte posterior de los élitros es convexa sin espinas	La parte posterior de los élitros son cóncavos y con un margen de espinas
Cuerpo cubierto con pelos rubio oscuro	Cuerpo sin pelos	Cuerpo con escaso pelo

Peak de vuelo: Agosto, Septiembre y Octubre
Aumento de insectos volando

El aumento de la población en vuelo de los escarabajos de la corteza del pino se debe a que las condiciones climáticas son menos frías y favorecen el desarrollo y aumento poblacional de los insectos.

Se solicita se tomen las medidas fitosanitarias adecuadas para mantener una exportación libre de agentes fitosanitarios.

Recomendaciones generales:

Pulverizaciones: Se recomienda que se realicen en piso y un día antes del despacho, con insecticidas que cumplan con los estándares vigentes.

Área Protegida: Sector de acopio, que además de cumplir con tener piso de concreto, esta cerrado en sus costados y techo, al menos con malla rashell doble.

Sopleteo: Al despacho es conveniente “sopletear” los productos terminados con aire comprimido sobre 6 bar de presión, usando una boquilla de 1 metro aproximadamente; se debe efectuar la labor entre los paquetes, entre los pallets, en la cubierta del medio de transporte, etc.

Cambio de Horario despacho de productos: En periodos de vuelo de escolítidos, se debe cargar y despachar los productos terminados entre las 19:00 y las 09:00 horas.

Trampa Embudo: Elemento compuesto por ocho embudos, atrayente, tarjeta de registro y dos trozos de collar de perro. Se usa durante todo el año bajo normativa SAG en Plan de trabajo N° 3/2014 SAG-CPF S.A.