

Descripción


Insecto del Orden Coleoptera, Familia Curculionidae.

- Los adultos miden entre 5 y 11 mm. y pueden vivir hasta 20 meses.
- La cabeza se prolonga en una trompa larga, las antenas de tipo geniculada están en la mitad de la trompa.




Reconocimiento

- Las larvas y adultos invernan debajo de la corteza de los troncos o escondidos en la tierra o grietas de la corteza de los árboles.
- Orificios de salida de los adultos con abundante aserrín bajo la corteza.



Daño

- En Primavera Verano, se observan acículas muertas o con coloraciones amarillas o rojizas, llegando a matar yemas o ramillas.
- Muerte regresiva del árbol desde el ápice hacia abajo.
- Pequeños orificios cubiertos de resina en los brotes y crecimiento de los últimos años.



Control

- Control Cultural: Eliminar restos de Podas y Raleos. Con árboles cebo, se instalan a mediados de primavera y de verano y se retiran antes de la emergencia de los nuevos adultos.
- Control biológico: En Francia con los parásitos *Eubazus semirugosus* y *Coeloides* sp.



Época de Detección

Adultos: el período de vuelo es durante las estaciones de primavera y verano. Énfasis en los meses de septiembre a octubre.
Huevos: Entre las estaciones de verano y otoño.

